

Un médicament contre la sclérose en plaque

Un nouveau traitement visant à réduire l'aggravation de la sclérose en plaques pourrait être distribué. Ce médicament serait par ailleurs moins contraignant que les actuelles injections : il pourrait être administré par voie orale pendant une dizaine de jours par an. Cependant, l'autorisation n'est pas acquise et des effets indésirables ont été rapportés. Aujourd'hui, un adulte sur mille est atteint de la sclérose en plaques. (source : AFP du 21 janvier 2010)

Plus de cigarettes vendues en France en 2009

Les Français ont acheté plus de cigarettes en 2009 que l'année précédente. Les ventes ont enregistré une hausse de 2 % alors que les interdictions de fumer se multiplient. Selon le troisième vendeur de tabac en France, cela ne signifie pas que les Français consomment plus, mais qu'ils achètent moins dans les pays frontaliers.

Les antidépresseurs parfois inefficaces

Les antidépresseurs seraient inopérants pour les patients atteints de dépression légère ou modérée. Seules les formes sévères seraient soulagées par ce type de médicaments. C'est ce que révèle une étude menée aux États-Unis sur un panel de dépressifs. L'auteur de ce rapport indique la méconnaissance des prescripteurs et des consommateurs dans l'usage de ces remèdes.

Grippe A H1N1 - La France en dessous du seuil épidémique

La France est arrivée en dessous du seuil épidémique de la grippe A H1N1. C'est ce qu'a annoncé mi-janvier le réseau Sentinelles-Inserm, après deux semaines de décrue. Les centres de vaccination sont d'ailleurs désormais fermés. Cela ne veut pas dire pour autant que le virus est inactif : des cas sont toujours décelés. Si vous souhaitez vous faire vacciner, allez chez votre médecin traitant.

Amélioration du fonctionnement des MDPH

Une proposition de loi visant à améliorer le fonctionnement des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) a été déposée fin décembre. Ces lieux d'accueil qui accompagnent les familles dans leurs démarches quotidiennes sont victimes de leur succès. Pour être plus opérationnelles, le sénateur à l'initiative de la proposition insiste sur l'importance de la consolidation du fonctionnement de ces maisons.

Tumeurs malignes - Première pathologie des ALD

Les tumeurs malignes arrivent en tête des Affections longue durée (ALD). Elles sont suivies du diabète, de l'hypertension et des affections psychiatriques. Ces données sont fournies par la Caisse nationale d'assurance-maladie (Cnam), qui en dresse un panorama. En France, les Affections longue durée touchent près d'une personne sur sept.

Risques élevés d'hypertension artérielle chez les personnes défavorisées

Les personnes défavorisées risquent plus de développer une hypertension artérielle. Selon une étude de l'Inserm, la pression artérielle augmenterait pour les personnes dont le niveau d'instruction et le niveau d'instruction moyen du lieu de résidence sont faibles. Pour les chercheurs, cette observation « encourage à des actions ciblées au bénéfice des populations vivant dans des quartiers défavorisés ».

Source : <http://www.smatiss.fr/breves-1-2010>